

Clasificación Botánica de las Hortalizas		
Familia Botánica	Nombre común	Especie botánica básica
Gramíneas	Maíz Dulce	<i>Zea mays</i> . var. <i>sacharata</i>
Liliáceas	Cebolla común	<i>Allium cepa</i> L.
	Ajo	<i>Allium sativum</i> L.
	Puerro	<i>Allium ampeloprasum</i> L.
	Espárrago	<i>Asparagus officinalis</i> L.
Quenopodiáceas	Espinaca	<i>Spinacia oleracea</i> L.
	Acelga	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cicla</i> L.
	Remolacha	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>suculenta</i> Salisb.
Aizoáceas	Espinaca de Nueva Zelandia	<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pall.)Kuntze.
Crucíferas	Repollo liso blanco	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. F. <i>alba</i> . D.C.
	Repollo liso colorado	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. F. <i>rubra</i> (L) Thell.
	Repollo crespo	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabauda</i> L.
	Coliflor	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L. subvar. <i>cauliflora</i> D.C.
	Bróccoli	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L. subvar. <i>cymosa</i> Lam.
	Repollito de Bruselas	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> D.C.
	Nabo	<i>Brassica campestris</i> L. Subesp. <i>rapifera</i> (Metag.) Sinsk.
	Repollo chino	<i>Brassica campestris</i> L. Subesp. <i>pekinensis</i> (Lour) Olsson
	Rábano y Rabanito	<i>Raphanus sativus</i> L.
	Berro de Agua	<i>Nasturtium officinale</i> R Brown.
Rosáceas	frutilla	<i>Fragaria ananassa</i> Duch.
Leguminosas	Haba	<i>Vicia fava</i> L.
	Arveja	<i>Pisum sativum</i> L.
	Lenteja	<i>Lens culinaris</i> Medick.
	Lupino	<i>Lupinus albus</i> L.
	Garbanzo	<i>Cicer arietinum</i>
	Poroto común	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
	Poroto manteca	<i>Phaseolus lanatus</i> L.
	Poroto pallar	<i>Phaseolus coccineus</i> L.
	Caupi	<i>Vigna sinensis</i> (L) Merrill
Soja	<i>Glycine max</i> (L) Merrill	
Euphorbiáceas	Mandioca	<i>L'anihot esculenta</i> Grants
Umbelíferas	Zanahoria	<i>Daucus carota</i> L. Var <i>sativa</i> D.C.
	Apio	<i>Apium graveolens</i> L. var <i>dulce</i> (Mill) Pearson.
	Apionabo	<i>Apium graveolens</i> L. var <i>rapaceum</i> (Mill) D.C.
	Hinojo	<i>Foeniculum vulgare</i> Hill Var. <i>Azoricum</i> (Mill) Thell
	Perejil	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill) Nym.
Convolvuláceas	Batata	<i>Ipomoea batatas</i> (L) Lam.
Solanáceas	Papa	<i>Solanum tuberosum</i> L. Subesp. <i>Tuberosum</i> .
	Berenjena	<i>Solanum melongena</i> L.

	Tomate	<i>Lycopersicon sculentum</i> Mill.
	Pimiento y ají	<i>Capsicum annum</i> L.
Cucurbitáceas	Zapallo tipo angola	<i>Cucurbita pepo</i> L.
	Calabaza de cuello	<i>Cucurbita mixta</i> Pang.
	Anco	<i>Cucurbita moschata</i> Duch
	Zapallo típico	<i>Cucurbita máxima</i> Duch.
	Cayote	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouche
	Chayote	<i>Sechium edule</i> (Jacq:) Swartz
	Pepino	<i>Cucumis sativus</i> L.
	Melón	<i>Cucumis melo</i> L.
	Sandía	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad
Compuestas	Lechuga	<i>Lactuca sativa</i> L.
	Escarola	<i>Cichorium endivia</i> L.
	Achicoria	<i>Cichorium intybus</i> L.
	Alcaucil	<i>Cynara scolimus</i> L.
	Salsifí Blanco	<i>Tragepegea porrifolius</i> L.